



Piretro Natura

Bioinseticida à base de piretrinas naturais

Características

A formulação do **Piretro Natura** contém como princípio activo piretrinas naturais, extraídas do crisântemo em formulação estável compatível com outros tratamentos inseticidas.

O **Piretro Natura** não contém butóxido de piperonila ou outras substâncias que podem deixar resíduos químicos nas culturas.

Modo de ação

O **Piretro Natura** age por contacto e ingestão, por isso recomenda-se molhar bem toda a superfície foliar, principalmente na página inferior das folhas, onde a praga se encontra preferencialmente.

Benefícios

- ▶ O **Piretro Natura** tem um efeito de choque altamente eficaz;
- ▶ Pode ser usado na agricultura convencional, resíduo zero e agricultura Biológica;
- ▶ O **Piretro Natura** apresenta baixas doses de aplicação;
- ▶ Uma formulação com boas sinergias;
- ▶ Intervalo de segurança inferior a 3 dias.

Composição

- ▶ 40 g/L ou 4,3 % (p/p) de piretrinas.
- ▶ Formulação: concentrado para emulsão (EC).
- ▶ pH: 4.

Bioinseticida à base de piretrinas naturais



Condições de utilização

A pulverização deve ser feita com temperaturas baixas e evitar-se a luz solar directa. O produto é mais eficaz quando se aplica ao início ou final do dia, quando as temperaturas são mais baixas. Degrada-se rapidamente na presença de luz solar. Sendo um produto de contacto, deve assegurar-se uma boa cobertura das plantas. Utilizar um volume de calda adequado, para assegurar uma boa cobertura, incluindo a página inferior das folhas.

Recomenda-se aplicações com as seguintes características:

Cultura	Doença/ Inimigo	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo de aplicações por cultura/época	I.A.(dias)*	Dose	Conc.	Volume de Calda (min-máx)	I.S.(dias)**
HORTÍCOLAS								
Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga, abóbora-cabaça, abóbora-chila, abóbora-menina, abóbora-porqueira) (Ar livre)	Moscas-brancas	<i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Ao aparecimento da praga	2 a 7	0,75 L/ha	75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	1
Abóbora (abóbora-menina) (Ar livre)	Mosca-branca-das-estufas	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>				75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	1
Aboborinha ("courgette") (Ar livre e Estufa)						75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	1
Aboborinha ("courgette") (Ar livre e Estufa)	Mosca-branca	<i>Bemisia tabaci</i>				75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	1
Alface (Ar livre e Estufa)	Afídeo-da-alface	<i>Nasonovia ribisnigri</i>			0,6 L/ha	75 - 90 mL/hL	600 - 800 L/ha	2
Beringela (Ar livre e Estufa)	Mosca-branca-das-estufas	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>			0,75 L/ha	75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	1
	Mosca-branca	<i>Bemisia tabaci</i>						
Escarola (=chicória-frisada, chicória-de-folha-larga) (Ar livre e Estufa)	Afídeos	<i>Myzus</i> sp.			0,6 L/ha	75 - 90 mL/hL	600 - 800 L/ha	2
Espinafre (Ar livre e Estufa)	Afídeos	<i>Myzus</i> sp.			0,6 L/ha	75 - 90 mL/hL	600 - 800 L/ha	2



Bioinseticida à base de piretrinas naturais



Condições de utilização (cont.)

Cultura	Doença/ Inimigo	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo de aplicações por cultura/época	I.A.(dias)*	Dose	Conc.	Volume de Calda (min-máx)	I.S.(dias)**	
HORTÍCOLAS									
Melancia (Ar livre)	Mosca-branca	<i>Bemisia tabaci</i>	Ao aparecimento da praga		2 a 7	0,75 L/ha	75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	1
	Mosca-branca- das-estufas	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>							
Meloeiro (Ar livre)	Mosca-branca- das-estufas	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>			2 a 7				
	Mosca-branca	<i>Bemisia tabaci</i>							
Pepino (Ar livre e Estufa)	Mosca-branca	<i>Bemisia tabaci</i>			2 a 7				
	Mosca-branca- das-estufas	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>							
Pimenteiro (Ar livre e Estufa)	Mosca-branca- das-estufas	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>			2 a 7				
	Mosca-branca	<i>Bemisia tabaci</i>							
Tomateiro (Ar livre e Estufa)	Mosca-branca	Bemisia tabaci			2 a 7				
	Mosca-branca- das-estufas	Trialeurodes vaporariorum							
VINHA									
Videira (Ar livre)	Cicadela-da- vinha	<i>Empoasca vitis</i>	Ao aparecimento da praga. Após a floração, a partir do bago-de- ervilha (BBCH75)		0,75 L/ha	75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	3	
	Cicadélídeo-da- flavescência- dourada	<i>Scaphoideus titanus</i>							



Piretro Natura

Bioinseticida

Bioinseticida à base de piretrinas naturais



Condições de utilização (cont.)

Cultura	Doença/ Inimigo	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo de aplicações por cultura/época	I.A.(dias)*	Dose	Conc.	Volume de Calda (min-máx)	I.S.(dias)**	
PEQUENOS FRUTOS									
Amora-silvestre (Ar livre)	Afídeo-verde	<i>Myzus persicae</i>	Ao aparecimento da praga	2	2 a 7	0,75 L/ha	75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	3
	Afídeo-dos- citrinos	<i>Aphis spiraeicola</i>							
	Afídeo-do- algodoeiro	<i>Aphis gossypii</i>							
	Afídeo	<i>Aphis ruborum</i>							
Framboesa (Ar livre)	Afídeo	<i>Aphis ruborum</i>	Ao aparecimento da praga	2	2 a 7	0,75 L/ha	75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	3
		<i>Amphorophora idaei</i>							
Morangueiro (Ar livre)	Moscas- brancas	<i>Bemisia tabaci</i> ; <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Ao aparecimento da praga	2	2 a 7	0,75 L/ha	75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha	3
	Afídeo-verde	<i>Myzus persicae</i>							
	Afídeo-do- morangueiro	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>							
	Afídeo-da- batateira	<i>Aulacorthum solani</i>							
	Afídeo	<i>Aphis ruborum</i>							
	Afídeo-do- algodoeiro	<i>Aphis gossypii</i>							
FRUTEIRAS									
Cerejeira	Afídeo-verde	<i>Myzus persicae</i>	Aplicar apenas em pré-floração, ao aparecimento da praga	2 a 7	0,75 L/ha	75 - 90 mL/hL	800 - 1000 L/ha		
Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro)									
Pessegueiro (inclui nectarina)	Afídeo-verde	<i>Myzus persicae</i>	Ao aparecimento da praga						

I.A. (dias)*: intervalo entre aplicações em dias

I.S. (dias)**: índice de segurança ou reentrada em dias

Embalagem: 1 L, 5 L

Autorização de venda nº 1048 concedida pela DGAIV.

