



Julietta®

Biofungicida para o controlo de Botrytis, à base da estirpe LAS02 da levedura *Saccharomyces cerevisiae*

Características

O **Julietta®** é um biofungicida preventivo e de amplo espectro. A estirpe LAS02 de *Saccharomyces cerevisiae* apresenta um rápido desenvolvimento o que lhe permite proteger as portas de entrada da podridão cinzenta e moniliose em áreas sensíveis (frutos, feridas de poda, flores).

A levedura consegue crescer em gamas de temperatura e pH mais amplas do que a podridão cinzenta e a moniliose. Por conseguinte, **Julietta®** proporciona uma proteção robusta contra agentes patogénicos.

Modo de ação

O **Julietta®** tem um modo de ação preventiva é através da competência nutricional e espacial (rápida colonização nos tecidos danificados) que a levedura faz, com um efeito de inibição ao desenvolvimento de fungos patogénicos.

Caracteriza-se por um marcado efeito cicatrizante e de proteção aos tecidos vegetais e frutos. Não deixa resíduos e quando aplicado na vinha não afeta aos processos de vinificação.

Benefícios

- ▶ O **Julietta®** tem um modo de ação preventivo e de amplo espectro;
- ▶ A formulação do **Julietta®** não afeta a vinificação;
- ▶ O **Julietta®** tem efeito cicatrizante, confere uma proteção pós-colheita e não deixa resíduos.

Composição

- ▶ 96,1 % da estirpe LAS02 de *Saccharomyces cerevisiae* – 1013 UFC/kg;
- ▶ Formulação: granulado dispersível em água (WG)
- ▶ pH - 5,8

Biofungicida para o controlo de Botrytis, à base da estirpe LAS02 da levedura *Saccharomyces cerevisiae*




Condições de utilização

É importante realizar tratamentos preventivamente. Por ser um organismo vivo, é aconselhável, não mandatário hidratá-lo em água morna (< 35°C) durante 15 minutos. Manter a agitação do depósito ligada durante toda a aplicação. Em temperatura ambiente, Julietta® tem uma vida útil de armazenamento de 2 anos.

Recomenda-se aplicações foliares com as seguintes características:

Cultura	Doença/Inimigo		Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo de aplicações por cultura/época	I.A.(dias)*	Dose	Volume de Calda (min-máx)	I.S.(dias)**
VINHA								
Videira (Uva de mesa e uva para vinificação ao Ar livre)	Podridão-cinzenta-dos-cachos	<i>Botrytis cinerea</i>	Realizar 4 tratamentos: à floração/alimpa, ao pintor e em anos muito favoráveis à doença ao fecho dos cachos e 3 a 4 semanas antes da vindima (BBCH 60 a 89)	4 - 6	7 a 14	2,5 kg/ha	500 - 1000 L/ha	1
FRUTEIRAS								
Ameixeira (Ar livre)	Moniliose	<i>Monilinia fructigena</i> ; <i>Monilinia laxa</i>	Realizar os tratamentos preventivamente, desde o entumescimento dos gomos até à colheita dos frutos (BBCH 51 a 89)	8	7 a 14	2,5 kg/ha	500 - 1000 L/ha	1
Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) (Ar livre)								
Nectarina (Ar livre)								
Pessegueiro (Ar livre)								
HORTÍCOLAS								
Beringela (Protegida)	Podridão-cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Iniciar as aplicações desde o início da floração enquanto as condições climáticas decorrerem favoráveis à doença (BBCH 12 - 89)	8	7 a 14	2,5 kg/ha	500 - 1000 L/ha	1
Pimenteiro (Protegida)								
Tomateiro (Protegida)								



Biofungicida para o controlo de Botrytis, à base da estirpe LAS02 da levedura *Saccharomyces cerevisiae*



Condições de utilização (cont.)

Cultura	Doença/Inimigo		Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo de aplicações por cultura/época	I.A.(dias)*	Dose	Volume de Calda (min-máx)	I.S.(dias)**
PEQUENOS FRUTOS								
Amora-silvestre (Ar livre e Protegida)	Podridão-cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Iniciar as aplicações desde o início da floração enquanto as condições climáticas decorrerem favoráveis à doença (BBCH 12 - 89)	8	7 a 10	2,5 kg/ha	500 - 1000 L/ha	1
Framboesa (Ar livre e Protegida)								
Groselheira (Ar livre e Protegida)								
Mirtilo-azul (=arando-azul); Mirtilo-vermelho (=arando-vermelho) (Ar livre e Protegida)								
Morangueiro (Ar livre e Protegida)								

*I.A. (dias): intervalo entre aplicações em dias

**I.S. (dias): índice de segurança ou reentrada em dias

Embalagem: 0,5 kg e 5kg

