



Funcitive®

Biofungicida à base da substância básica de Lecitinas

Características

O **Funcitive®** é uma formulação feita a partir de lecitinas especificamente selecionadas com um alto teor de fosfoglicéridos naturais.

É um produto com efeito fungicida. Atenua os efeitos da necrose das células da lâmina foliar causada pela disseminação de hifas fúngicas nas células vegetais. Não deixa resíduos.

Modo de ação

O **Funcitive®** tem ação fungicida, dificultando a penetração de fungos fitopatogénicos nas plantas, inibindo a esporulação e a germinação dos esporos.

Benefícios

- ▶ Forte efeito fungicida;
- ▶ O **Funcitive®** não deixa resíduos e adequado para o modo de produção biológico;
- ▶ Não provoca fototoxicidade nem afeta ao processo fotossintético;
- ▶ Reduz o risco de desenvolvimento de resistências.

Composição

- ▶ Lecitinas 100% (p/p)

Biofungicida à base da substância básica de Lecitinas



Condições de utilização

Recomenda-se realizar pulverizações de acordo com o indicado na tabela:

Cultura	Doença/Inimigo		Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo de aplicações por cultura/época	I.A.(dias)	Concentração
FRUTEIRAS						
Macieira, Pessegueiro (Ar livre)	Oídio	<i>Podosphaera leucotricha</i>	Iniciar as aplicações preventivamente, antes da infeção, em condições favoráveis à doença, a partir de BBCH 03 a BBCH 79	3 a 12	5 - 10	250 - 300 mL/hL
	Lepra do pessegueiro	<i>Taphrina deformans</i>				
HORTÍCOLAS						
Pepino, Courgete (Ar livre e Protegido)	Oídio	<i>Podosphaera xanthii</i>	Iniciar as aplicações preventivamente, antes da infeção, em condições favoráveis à doença, a partir de BBCH 10 a 89	2 a 6	5 - 10	250 - 300 mL/hL
Endívia (Ar livre e Protegido)	Alternariose	<i>Alternaria cichorii</i>	Iniciar as aplicações preventivamente, antes da infeção, em condições favoráveis à doença a partir de BBCH 10 a BBCH 89	2 a 6	7 - 10	
Tomate (Ar livre e Protegido)	Requeima do tomateiro	<i>Phytophthora infestans</i>	Iniciar as aplicações preventivamente, antes da infeção, em condições favoráveis à doença, a partir de BBCH 10 a 89	2 a 6	7 - 10	
Alface, Canónigos (Ar livre e Protegido)	Oídio	<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Erysiphe polyphaga</i>	Iniciar as aplicações preventivamente, antes da infeção, em condições favoráveis à doença a partir de BBCH 10 a BBCH 89	1 a 2	7	



Biofungicida à base da substância básica de Lecitinas



Condições de utilização (cont.)

Cultura	Doença/Inimigo		Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo de aplicações por cultura/época	I.A.(dias)	Concentração
PEQUENOS FRUTOS						
Groselha (Ar livre)	Oídio	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	Iniciar as aplicações preventivamente, antes da infecção, em condições favoráveis à doença, a partir de BBCH 10 a 85	2 a 4	5 - 10	250 - 300 mL/hL
ORNAMENTAIS						
Roseira (Ar livre e Protegido)	Míldio, Oídio	--	Iniciar as aplicações preventivamente, antes da infecção, em condições favoráveis à doença a partir de BBCH 10 a BBCH 89	3 a 12	5 - 10	250 - 300 mL/hL

* Intervalo de Aplicação (dias)

**Intervalo de Segurança (dias)

Embalagens: 1 L, 5 L, 20 L, 200 L e 1000 L





Rovensa
Next